

Glista ludzka u dziecka

Popularne robaki u dzieci to także glista ludzka. Pasożyt osiągający długość do 52 cm. Dziecko może zarazić się nim, jedząc pokarm zanieczyszczony jajeczkami zawierającymi larwę. Groźne są zwłaszcza warzywa z hodowli przydomowych, nawożonych nawozem naturalnym, wzbogaconym ludzkimi odchodami.

Larwy glisty dostają się do jelita cienkiego, tam wydostają z jaja, przebijają do naczyń krwionośnych i z krwią dostają się do płuc i oskrzeli. Gdy zostaną odkrztuszone, wraz ze śliną ponownie dostają się do jelit, gdzie dojrzewają. Dorosła glista ludzka żyje w jelicie ponad rok, potem ginie, o ile nie dojdzie do powikłań (na przykład zapalenia wyrostka robaczkowego) lub ponownego zakażenia.

Objawy zarażenia glistą ludzką zależą od tego, gdzie pasożyt przebywa: w czasie wędrówki larw glisty przez płuca dziecko może chorować na zapalenie oskrzeli czy zapalenie płuc, gdy zaś trafi ona do jelit, malcowi dokuczają biegunki i bóle brzucha, nudności, wymioty, brak apetytu, bezsenność, bóle głowy, objawy alergiczne. Glistnicę ludzką leczy się podobnie jak owsicę.

Trzy etapy glistnicy

I. Etap związany z wędrówką larw

- reakcje i objawy alergiczne
- objawy uszkodzenia wątroby, śródbłonnów naczyń i ścian pęcherzyków płucnych połączone z krwawieniami i odczynami zapalnymi

II. Etap związany z zaburzeniami w normalnej wędrówce larw

- larwy mogą usadowić się w różnych nietypowych dla glisty ludzkiej narządach, jak oko, ucho, mózg, wątroba, śledziona, itp., gdzie po pewnym czasie otorbiają się, tworząc tzw. guzy robacze.

III. Etap związany z powikłaniami wywołanymi przez dojrzałe glisty w jelicie

- Szkodliwe działanie postaci dojrzałych polega przede wszystkim na zatrutowaniu organizmu żywiciela produktami przemiany materii.

JAK ZAPOBIEGAĆ GLISTNICY

- myjąc jarzyny i owoce przeznaczone do spożycia
- poprzez picie przegotowanej wody
- myjąc ręce przed jedzeniem, po zabawie w piasku, po pracy w ogrodzie, po skorzystaniu z toalety
- poprzez odpowiednie oczyszczanie i odprowadzanie ścieków zarówno zagrodowych, jak i miejskich
- poprzez leczenie wszystkich wykrytych przypadków glistnicy i niszczeniu glist wydalonych w czasie kuracji
- poprzez ograniczanie dostępu owadów do dołów kloacalnych i odchodów ludzkich, gdyż mogą one łatwo przenieść jajeczka glisty ludzkiej na naczynia kuchenne i spożywane produkty spożywcze

Owsiki u dzieci

Najczęstsze robaki u dzieci to owsiki. Owiski mają do 10 mm długości, żyją w świetle jelita. Wypelzają zeń głównie nocą, by złożyć jaja na łdach skóry w okolicy odbytu. Owsikami można się zarazić, po kontakcie z osobą już zarażoną, czy nawet przez kurz, w którym znajdują się jajeczka, osiadające następnie na produktach spożywczych.

Owsica u dzieci: można ją rozpoznać, jeśli dziecko ma zaczerwienioną skórę i skarży się, że swędzi je pupa. Inne objawy, mówiące o tym że dziecko ma owsiki to: osłabienie, ból brzucha i głowy, brak apetytu, anemia, nudności.

Leczenie owsików musi objąć wszystkich domowników, a przebieg leczenia kuracji trzeba codziennie zmieniać bieliznę osobistą, ścielową, dezynfekować łazienkę i ubikację, odkurzać posłanie, nie szczepienia na mokro z użyciem odkurzaczy mających filtry HEPA.

Tasiemiec u dziecka

Tasiemiec to pasożyty, które, jak sama nazwa wskazuje, mają płaski kształt taśmy. Robaki te mają główkę z haczykami, które służą im do przyczepienia się do jelita. Na ciało tasiemca składa się również głowa i liczne człony. Człony, w których znajdują się zapłodnione jaja, odrywają się od robaka i są wydalane z kałem. Jaja rozwijają się w środowisku zewnętrznym. Wypelzłe z nich zarodki "zamieszkują" w narządach wewnętrznych. Robaki u dzieci pojawiają się poprzez zjedzenie niedogotowanego zakażonego mięsa.

Objawia się obecność tasiemca w organizmie najmłodszych? Robaki u dzieci (i u dorosłych również) powodują takie objawy jak: biegunka, wymioty, brak apetytu, ból brzucha, drgawki. Warto pamiętać, że tasiemiec może ujawnić swoją obecność w organizmie dziecka dopiero kilka lat od zakażenia. Leczenie, jak w przypadku innych robaków u dzieci, polega na podaniu odpowiednich leków. Może trwać nawet do kilku miesięcy. Jak uniknąć zagnieżdżenia tasiemca w organizmie dziecka? Przede wszystkim nie podawać mięsa z niesprawdzonego źródła.

Robaki u dzieci tj. owsiki, glista, lamblia, włosogłówka, tasieniec są dość częste. Na zakażenie pasożytami jelitowymi narażone jest każde dziecko. Robaki u dzieci trudno zauważyć i dość trudno się przed nimi ustrzec. Robaki u dzieci zakażenie: pasożyty jelitowe dostają się do organizmu różnymi sposobami: z jedzeniem, przez podanie ręki czy drogą kropelkową.

Przyczyną zakażenia pasożytami u dzieci mogą być też zabawy z domowymi zwierzętami czy grzebanie rękami w ziemi. Rodzice nie wiedzą, że dziecko ma robaki, ponieważ często nie dają one żadnych objawów albo są one podobne do tych, jakie wywołują wirusy lub bakterie. Również wielu lekarzy nie zleca badań w kierunku chorób pasożytniczych, wiążąc nawracające biegunki, wysypki czy zapalenia oskrzeli z nietolerancją pokarmową, alergią lub chorobą.

Objawy robaków u dzieci

Jeśli twoje dziecko cierpi na powtarzające się infekcje, narzeka na bóle brzucha, ma anemię czy jest nadpobudliwe, zrób mu badanie kału lub wymaz na owsiki, bo być może przyczyną kłopotów są pasożyty jelitowe. W przypadku stwierdzenia obecności robaków u dziecka konieczne jest leczenie farmakologiczne. Po jego zakończeniu warto zrobić badania kontrolne, czy robaki u dziecka już nie występują.

jak mam **nie** występują.


[illegible]

Rokubi o daci i znowu, głębia, tematyka, wzrosła. Jesteście na dacie częściej. Na powołanie paszyscyłamy jawnie, niekiedy jest kade dziecko. Rokubi o daci i znowu, głębia, tematyka, wzrosła. Jesteście na dacie częściej. Na powołanie paszyscyłamy jawnie, niekiedy jest kade dziecko. Rokubi o daci i znowu, głębia, tematyka, wzrosła. Jesteście na dacie częściej. Na powołanie paszyscyłamy jawnie, niekiedy jest kade dziecko.

GLISTA LUDZKA

Ascaris lumbricoides

Czy nadal jest groźna?



Robaki u dzieci: owsiki, glista i lamblia -
co robić, gdy dziecko jest zakażone
pasożytami jelitowymi

2019-02-18



Autor: thinkstockphotos.com

Robaki u dzieci, pasożyty jelitowe, to dość częste zjawisko. Pasożyty u dzieci (owsiki, glista, lamblia, włosogłówka, tasiemiec) są często przyczyną anemii, bólów brzucha, nadpobudliwości czy powtarzających się infekcji. Jeśli podejrzewasz, że dziecko ma robaki, zrób mu badanie kału lub wymaz na owsiki, bo być może przyczyną kłopotów są pasożyty jelitowe.

CHARAKTERYSTYKA PASOŻYTA

Dorośle glisty bytują w jelicie cienkim człowieka. Ich długość od 15 do 40 cm i produkują 200 000 jaj dziennie, które są wydalane z kałem do środowiska zewnętrznego. Takim jajem zawierającym inwazyjną larwę może zarażać się znowu człowiek. Larwy wylęgają się w jelicie cienkim, skąd przenikają do naczyń krwionośnych i chłonnych. Teraz wędrują z krwią do wątroby, potem do płuc i przez tchawicę oraz gardło dostają się z powrotem do przewodu pokarmowego. Tu przekształcają się w ciągu 2 – 3 miesięcy w dorośle glisty i cykl życiowy się powtarza. Całkowity czas wędrówki trwa około 10 dni a długość życia tych pasożytów wynosi 1 – 13 miesięcy.

EPIDEMIOLOGIA

Glista ludzka występuje na całym świecie. W Europie inwazje są rzadkie ale w Ameryce Południowej, Afryce i Azji bardzo częste. Częstość występowania glistnicy w Polsce przez różnych badaczy jest oceniana od 1 do 18%. Do zakażenia dochodzi w wyniku zjedzenia zanieczyszczonego ziemią lub ściekami pokarmu (owoce, warzywa, woda) lub w wyniku niewystarczającej higieny (nieumyte ręce po zabawie w piasku czy pracy w ogrodzie). Wydalone z kałem jaja pasożyta w glebie w warunkach odpowiedniej wilgotności, temperatury i dostępności tlenu dojrzewają do postaci inwazyjnej i mogą być zaraźliwe w takim środowisku przez wiele lat. Szybko zaś giną w wyniku wysuszenia.

CHOROBOTWÓRCZOŚĆ

Reakcja człowieka na zarażenie glistą ludzką zależy od intensywności inwazji pasożytniczej oraz od osobniczej wrażliwości gospodarza.